



علاجات الالتهاب الرحمى الحاد

يؤدى المرض إلى فقد الحيوان لشهيته..
ونقص فى إدرار اللبن.. وارتفاع فى درجة حرارته..
وعدم قدرته على الوقوف



**د. مصطفى
فايز**

أستاذ الطب البيطري
جامعة قنادة السويس

- ٣- قد يوجد ارتفاع فى درجة الحرارة.
- ٤- زيادة فى سرعة التنفس
- ٥- إفرازات رحمية ذات لون داكن قد تميل إلى الأصفر أو اللون الأحمر الداكن، وقد تكون ذات رائحة كريهة.
- ٦- البقرة لا تقدر على الوقوف
- يظهر هذا المرض غالباً بعد الولادة مباشرة (٢-١٠ أيام بعد الولادة)، إذا كانت الحظائر غير نظيفة وإذا كانت المزرعة غير مهتمة بالإجراءات الصحية، وأعراضه هي:
- ١- فقد الشهية لدى الحيوان المصاب.
- ٢- نقص فى إدرار اللبن.



للحماية من الالتهاب الرحمي الحاد يجب: ألا تزيد فترة الجفاف على شهرين.. وضع برامج صحية للحماية من المرض.. عدم استخدام السوائل داخل الرحم عقب الولادة

الكالسيوم وإعطاء الفيتامينات والأملاح وخصوصاً فيتامين «أ» أو فيتامين «هـ» علاوة على السيلينيوم.

٣- وضع برنامج صحية للحماية من الأمراض التي تسبب مشكلات تناسلية.

٤- التدخل الصحي المناسب في حالة الولادة العسيرة مع استخدام قش الأرز، ويجب تطهير مكان الولادة.

٥- عدم استخدام السوائل داخل الرحم في الفترة الأولى.

٥- تفريغ الرحم من محتوياته بإحدى الطرق الآتية:
أ- حقن هرمون الأوكسيتوسين خلال أول ٢٤ ساعة.

ب- حقن هرمون البروستاجلاندين بعد ٤٨ ساعة.

كيفية الحماية من الالتهابات الرحمية:

١- مراعاة أن تكون فترة الجفاف مناسبة لا تزيد على شهرين.

٢- الاهتمام بالحيوان العشار أثناء فترة الجفاف؛ عن طريق التغذية المناسبة وضبط مستوى

كثيراً وتظهر عليها علامات الإسهال نتيجة للتسمم البكتيري.

العلاج:

يستحسن أن نتعامل مع الحالة على أنها حالة تسمم بكتيري حاد؛ وذلك من أجل المساعدة على حيوية الخلايا والأنسجة ورفع المناعة، وعادة تعطى الآتى:

١- محلول ملح ومحلول رينجر لاكتات ورييد.

٢- كالسيوم بروجلوكونيت (مع ملاحظة ضربات القلب عند الحقن وتدفقتها لدرجة حرارة الحيوان قبل الحقن وبطء شديد).

٣- مضاد التهاب غير ستيروидى (فلونكسين ميجلومين).

٤- مضاد حيوى واسع المجال (الطيف) حقناً (أكسيد ٣ سم / ١٠٠ كجم تحت الجلد).